

CARACTERÍSTICAS

AMINOCHEM® MO es un bioestimulante a base de aminoácidos que estimula la germinación, el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado y el crecimiento de frutos. Especialmente diseñado para favorecer todos los procesos de las plantas tales como: fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, etc. Su empleo esta especialmente indicado para complementar la fertilización nitrogenada en aquellos cultivos con alta requerimiento de nitrógeno. AMINOCHEM® MO es un producto autorizado para su uso en agricultura orgánica para los mercados EU, NOP y JAS gracias a su procedencia vegetal y a un proceso exclusivo de obtención haciendo de este producto una de las fuentes de nitrógeno en forma líquida y soluble para estos cultivos.

COMPOSICIÓN

	% p/v
Nitrógeno total (N).....	7,45
Nitrógeno Orgánico.....	6,70
Nitrógeno Amoniacal.....	0,7
Aminoácidos totales.....	37,3
(*)Materia Orgánica Total.....	42,9
(*)Extracto Húmico Total.....	39,50
(*)Ácidos Fúlvicos.....	39,50

(*) Contenido mínimo garantizado

pH : 6,0 – 7,5
Densidad : 1,10- 1,30 g/ml
Solubilidad en agua: 90% a 20 °C.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usar adecuadamente AMINOCHEM® MO, se recomienda agitar el envase antes de abrir, luego agregar agua al estanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad, posteriormente incorporar la dosis recomendada de AMINOCHEM® MO y finalmente llenar el estanque.

PRECAUCIONES: AMINOCHEM® MO debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 1-40°C. Mantener el envase en un lugar fresco y aireado. AMINOCHEM® MO es un producto no tóxico y no inflamable. Se recomienda el uso de protección adecuada durante su aplicación.

COMPATIBILIDAD: No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

NOTA AL COMPRADOR

A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de control, en medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su contenido directo.

Etiqueta valida para Perú

Aminochem®
BIOESTIMULANTE
A BASE DE AMINOÁCIDOS



Estimula la germinación,
el desarrollo vegetativo, la floración,
el cuajado y el crecimiento de frutos.
**Indicado para cultivos
ORGÁNICOS.**



CONTENIDO NETO DEL ENVASE:

☐ 1 L ☐ 5 L ☐ 20 L ☐ 200 L



APLICACIONES

FOLIAR: 400 - 600 ml/200 L
FERTIRRIGACIÓN: 5 – 10 L/ha

CULTIVO	RECOMENDACIONES
Arándano. Uva de mesa. Palto. Mango.	Aplicaciones al inicio del brotamiento, floración y llenado del fruto.
Limón, mandarina, naranja, tangelo. fresa, berries. Granada.	Aplicaciones al inicio de brotación, floración y llenado de fruto.
Alcachofa. Espárrago.	Aplicación durante el crecimiento del cultivo.
Tomate. Pimiento, paprika, piquillo, aji.	Aplicaciones al inicio de floración y llenado de fruto.
Lechuga, espinaca, acelga, apio.	Dosis total dividirla en partes iguales desde el trasplante, hasta el crecimiento cada 15 días.
Brócoli, coliflor, col.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo y al desarrollo de la inflorescencia
Cebolla.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo y al llenado de bulbo.
Melón, sandía, pepinillo, zapallo.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo, floración y cuajado.
Papa.	Aplicar al inicio de tuberización y repetir las aplicaciones cada 10 días.
Arveja, frejoles, holantao, haba, lenteja, garbanzo.	Aparición de las 1eras hojas verdaderas, crecimiento vegetativo, floración y llenado.
Pitahaya.	A los 20 días después del trasplante.
Quinua.	Aplicar al inicio de la floración y repetir las aplicaciones cada 10 días.
Café, Cacao.	Aplicar al inicio de la floración y crecimiento de fruto.
Banano.	Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia y crecimiento del racimo.

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según los reglamentos CE N° 834/2007 y 889/2008, NOP y JAS. Control Ecocent SA F-32600.



Fabricado para Chemie Agroveterinaria® S.A.C. por AGRICÔ BIOTECH S.L. (España)
Importado y Distribuido por Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
Av. Tomas Ramsey 930 Of. 905
Magdalena del Mar, Lima, Perú.
FONO: (51-1) 505-4301
R.U.C. 20519361672

www.chemiesa.com

PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA

ETIQUETA AMINOCHEM MO X 1,5,20,200 L

FECHA: 21.03.2025

VERSION: 14

TAMAÑO: 27 X 15 CMS

IMPRESION: FULL COLOR

MATERIAL: COUCHE ADHESIVO SEGURIDAD

ACABADO FINAL: BARNIZ OFFSET Y SEMI CORTE PARA DESGLOSE