

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 18-03-2025

PRODUCTO:
AMINOCHEM® MO



I. Nombre Comercial	: AMINOCHEM® MO
II. Ingrediente Activo	: Extracto húmico, Nitrógeno, Aminoácidos, Materia orgánica, Ácidos fúlvicos.
III. Tipo	: Bioestimulante
IV. Concentración	: Nitrógeno total (N) 7,45 % p/v Nitrógeno Orgánico 6,70 % p/v Nitrógeno Amoniacal 0,7 % p/v Aminoácidos totales 37,3 % p/v Materia Orgánica total.....42,9 % p/v Extracto Húmico Total.....39,50 % p/v Ácidos Fúlvicos.....39,50 % p/v
V. Densidad	: 1,10- 1,30 g/ml
VI. pH	: 6,0 - 7,5
VII. Formulación	: Concentrado Soluble (SL).
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: AMINOCHEM® MO es un bioestimulante a base de aminoácidos que estimula la germinación, el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado y el crecimiento de frutos. Especialmente diseñado para favorecer todos los procesos de las plantas tales como: fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, etc. Su empleo esta especialmente indicado para complementar la fertilización nitrogenada en aquellos cultivos con alta requerimiento de nitrógeno. AMINOCHEM® MO es un producto autorizado para su uso en agricultura orgánica para los mercados EU, NOP y JAS gracias a su procedencia vegetal y a un proceso exclusivo de obtención haciendo de este producto una de las fuentes de nitrógeno en forma líquida y soluble para estos cultivos.
XII. Compatibilidad	: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 14
Fecha Revisión: 18-03-2025

PRODUCTO:
AMINOCHEM® MO



- XIII. Fitotoxicidad** : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
- XIV. Precauciones** : Debe protegerse de temperaturas extremas. Almacenamiento óptimo en un intervalo de 5 - 40 °C. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

XV. Instrucciones de uso:

FOLIAR: 400 - 600 ml/200 L
FERTIRRIGACIÓN: 5 - 10 L/ha

CULTIVO	RECOMENDACIONES
Arándano Uva de mesa Palto Mango	Aplicaciones al inicio del brotamiento, floración y llenado de fruto.
Limón, mandarina, naranja, tangelo. Fresa, berries. Granada	Aplicaciones al inicio de brotación, floración y llenado de fruto.
Alcachofa. Espárrago.	Aplicación durante el crecimiento del cultivo.
Tomate. Pimiento, paprika, piquillo, ají.	Aplicaciones al inicio de floración y llenado de fruto.
Lechuga, espinaca, acelga, apio.	Dosis total dividirla en partes iguales desde el trasplante, hasta el crecimiento cada 15 días.
Brócoli, coliflor, col.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo y al desarrollo de la inflorescencia
Cebolla.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo y al llenado de bulbo.
Melón, sandía, pepinillo, zapallo.	Al trasplante, al crecimiento vegetativo, floración y cuajado.
Papa.	Aplicar al inicio de tuberización y repetir las aplicaciones cada 10 días.
Arveja, frejoles, holantao, haba, lenteja, garbanzo.	Aparición de las 1eras hojas verdaderas, crecimiento vegetativo, floración y llenado.
Pitahaya.	A los 20 días después del trasplante.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 14
Fecha Revisión: 18-03-2025

PRODUCTO:
AMINOCHEM® MO



Quinoa.	Aplicar al inicio de la floración y repetir las aplicaciones cada 10 días.
Café, Cacao.	Aplicar al inicio de la floración y crecimiento de fruto.
Banano.	Aplicar al inicio de la formación de la inflorescencia y crecimiento del racimo.

Ficha técnica válida para Perú