

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación, use el equipo EPP.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa por separado y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas, bajo condiciones que garanticen su conservación y bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con los alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento, en horas de baja radiación solar y sin precipitaciones.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo: Extracto Vegetal

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No proporcionar nada a una persona inconsciente. Trasladar de inmediato al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar a la persona a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario. Llamar inmediatamente a un médico.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 / CINNAMON SAC: 997 220 509

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No permitir animales en el área.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envase vacíos.
- Evitar la deriva por el viento.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.

BIOSTRACTUM Clavo

EXTRACTO VEGETAL

INSECTICIDA FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Eugenol 100 g/L
Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. N° - SENASA-PBA-EV

Titular del Registro:
CINNAMON S.A.C.
Av. Flora Tristán Nro.158
Dpto.103-La Molina, Perú
Telf: 997220509

Formulado y distribuido por:
CINNAMON S.A.C



Contenido Neto:

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BIOSTRACTUM CLAVO es un insecticida-fungicida biológico de acción por contacto, formulado a base de eugenol (extracto de clavo de olor). Presenta alta eficacia contra insectos y enfermedades, sin afectar organismos benéficos ni a los biocontroladores. Como insecticida, induce estrés fisiológico y efecto repelente, provocando parálisis y muerte del insecto. Como fungicida, se acumula en la membrana celular del hongo, altera su integridad estructural y provoca la disrupción de funciones celulares esenciales, inhibiendo el crecimiento micelial, afectando su desarrollo y causando su muerte.

BIOSTRACTUM CLAVO se aplica mediante equipos de aspersión terrestre, realizando previamente una premezcla. Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad con agua limpia ajustada a pH 6; posteriormente añadir el producto según la dosis recomendada, agitar constantemente y completar con agua hasta el volumen total.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i> <i>Planococcus citri</i>	0.5	N.A.	N.A.
Arándano	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.5	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre del arándano	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5	N.A.	N.A.

PC= Período de carencia (días) LMR= Límite máximo de residuos N.A.= No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando la plaga se encuentra presente, sin límite de número de aplicaciones, pues no causa efectos adversos al aplicador o al ambiente, ni residuos ni fitotoxicidad. En los cultivos señalados, se puede aplicar desde la etapa de brotamiento hasta fructificación. Se recomienda aplicar a primeras horas de la mañana o pasada la tarde.

PERIODO DE REINGRESO

No existen restricciones de reingreso, pero se recomienda esperar 4 horas hasta que las hojas estén secas,

COMPATIBILIDAD

Es compatible con formulaciones neutras, pero se recomienda no realizar mezclas.

FITOTOXICIDAD

BIOSTRACTUM CLAVO no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso listadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con distribuidor del producto.



PRECAUCIÓN

