

## CARACTERÍSTICAS

**FertiChem®Mg** es un complejo orgánico a base de magnesio, complejo con Gluconato de sodio y enriquecido con algas marinas, actúa básicamente en la formación de clorofila en la planta con efecto estimulante y de largo efecto residual. Actúa como biorregulador y potencializador del metabolismo de las plantas, a nivel de los procesos de fotosíntesis.

**FertiChem®Mg** interviene en la formación de Azúcares, Proteínas y Lípidos y en la translocación de Carbohi-

dratos. Aplicado de manera foliar se caracteriza por ser directamente asimilable por el vegetal, actuando no sólo como nutriente sino también como activador. La presencia de magnesio garantiza que no se frenará el crecimiento y desarrollo del cultivo.

**FertiChem®Mg** se recomienda para incrementar la producción, calidad y homogeneidad de los frutos, así como aumentar su estabilidad durante el transporte y almacenamiento.

## COMPOSICIÓN

|                |       |
|----------------|-------|
|                | p/v   |
| Magnesio (MgO) | 10.0% |
| Nitrogeno (N)  | 2.5%  |

**Acomplejado con Gluconato de sodio y enriquecido con algas**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Densidad | : 1,1 - 1,3 g/mL |
| pH       | : 1,5 - 3,0      |

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Para usar

adecuadamente **FertiChem®Mg**, se recomienda agitar el envase antes de abrir.

**COMPATIBILIDAD:** **FertiChem® Mg**, No mezclar con productos de extrema reacción ácida o alcalina. Es compatible con los productos fitosanitarios, sin embargo, en caso de duda se recomienda realizar pruebas de compatibilidad

## NOTA AL COMPRADOR

A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de control, en medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su contenido directo.

Etiqueta válida para Perú

“V15”

# FertiCHEM®

## Mg



## FERTILIZANTE LÍQUIDO

Para la formación de clorofila, efecto bioregulator y potencializador del metabolismo de las plantas

CONTENIDO NETO DEL ENVASE: ☐ 1 L ☐ 5 L ☐ 20 L ☐ 200 L

**CHEMIE®**  
Innovación Agroveterinaria

## APLICACIONES

### RECOMENDACIONES DE USO:

| CULTIVO                                         | DOSIS L./ha | RECOMENDACIONES                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uva de mesa.                                    | 2,5 – 5,0   | Al inicio de brotación y repetir 3 a 4 veces.                                                                                          |
| Limón, naranja, mandarina, tangelo, clementina. | 2,0 – 3,0   | Aplicar al cuajado de los frutos, repetir la aplicación cada 15 días. En variedades con semilla utilizar la dosis más alta.            |
| Palto<br>Mango                                  | 2,0 – 3,0   | Aplicar al cuajado de los frutos, repetir la aplicación cada 15 días.                                                                  |
| Espárrago                                       | 1,5 – 3,0   | Al inicio de cada brote y siempre que lo requiera el cultivo.                                                                          |
| Alcachofa                                       | 1,5 – 3,0   | Aplicar desde el almácigo y cada vez que se presenten síntomas de amarillamiento en la planta.                                         |
| Arándano, fresa, frambuesa                      | 1,5 – 3,0   | Aplicar al inicio del cuajado.                                                                                                         |
| Aji, páprika, pimiento, piquillo.<br>Tomate     | 1,5 – 3,0   | 15 días después del trasplante y las veces que sea necesario para mantener el follaje verde.                                           |
| Papa.                                           | 1,5 – 3,0   | Aplicar a partir de los 45 días.                                                                                                       |
| Vainita, frijol, holantao, pallar.              | 1,5 – 3,0   | Aplicar a los 25 días después de la emergencia y repetir al aporque, otra al inicio de la floración y cuando las vainas                |
| Arroz                                           | 1,5 – 3,0   | En almácigo antes del trasplante, al inicio de macolla y en punto de algodón.                                                          |
| Quinua                                          | 1,5 – 3,0   | Aplicar durante el desarrollo del cultivo.                                                                                             |
| Zapallo, sandía, melón, pepinillo               | 1,5 – 3,0   | Aplicar con el desarrollo del cultivo, principalmente desde el ataque de moscas blancas, para contrarrestar el “plateado” del follaje. |



Fabricado por CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.  
Av. Tomas Ramsey 930 Of. 905, Magdalena del Mar, Lima - Perú.  
FONO (51-1) 505-4301, R.U.C. 20519361672

[www.chemiesa.com](http://www.chemiesa.com)

PRODUCTO FABRICADO EN PERU