"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO Y APLICACIÓN

-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado, cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados, máximo por 7 días. Para prolongar la vida útil del producto, mantener en refrigeración entre 4 a 8°C.
- No almacenar ni transportan conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 2 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizar se para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los parpados estén levantados, retirar lentes de contacto si los hubiera.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.

-No tiene antídoto específico, tratar sintomáticamente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
SOLAGRO SAC: +51 914 278 470

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE

- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de las aplicaciones o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada, fauna o flora silvestre..

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

FUMOGAN

AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO MICROBIANO

INSECTICIDA AGRICOLA

Composición:

Isaria fumosorosea .....1 x 10^{12} conidias viables/Kg

Cepa SCF-11

Aditivos.....c. s.p. 1Kg

Reg. N° 071 - SENASA - PBA - ACBM

TITULAR DEL REGISTRO:

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C
Av. Metropolitana Mz F1 Lote 5, Urb. San Isidro.
Trujillo – Perú.
gestioncomercial@solagro.com.pe/ www.solagro.com.pe
telf.: +51 943 776 031 / +51 914 278 470

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOLAGRO

Contenido Neto: kg
N° de Lote:
Fecha de Formulación
Fecha de Vencimiento.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FUMOGAN (Cepa SCF–11) contiene un aislamiento natural selectivo de *Paecilomyces fumosoroseus (=Isaria fumosorosea)* que afecta a insectos del orden Hemíptera. **FUMOGAN** un hongo imperfecto natural que pertenece a la División Ascomycota.

Por cada bolsa de 800 g de **FUMOGAN** preparar una solución de 0.5 a 1 ml de surfactante agrícola en 1 Litro de agua, enseguida agregar todo el contenido de **FUMOGAN** y agitar la mezcla hasta retirar todas las esporas del maíz; luego colar la suspensión de esporas a través de una malla fina para evitar el paso del maíz al tanque (repetir los lavados por dos veces hasta observar el color característico del maíz).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

Cultivo	PLAGA		Dosis	PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Científico	(Kg/ 200 L)	(Días)	(ppm)
PALTO	Mosca blanca	*Aleurodicus juleikae*	1.6	N.A.	N.A.
ARANDANO	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	1.6	N.A.	N.A.
	Cochinilla harinosa	*Planococcus citri*	0.8 - 1.6	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplica

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION: FUMOGAN debe ser aplicado en horas de baja radiación solar (tarde o noche), usando un adherente foliar, con buena cobertura . Realizar de dos a tres aplicaciones por campaña, con una frecuencia entre 15 a 20 días, dependiendo de las evaluaciones. Se sugiere el uso de papel hidrosensible previo a la aplicación, ubicarlo donde se encuentra el insecto plaga, servirá como indicador para verificar una buena cobertura de aplicación de la solución de conidias. El papel hidrosensible debe tornarse completamente azul.

PERIODO DE REINGRESO: Reingresar después de 2 horas de haber secado el producto sobre las hojas.

COMPATIBILIDAD: FUMOGAN, no deberá mezclarse con Fungicidas, productos cúpricos, alcalinos o que alteren la viabilidad del Producto.
FITOTOXICIDAD: FUMOGAN, no provoca fitotoxicidad en plantas.
RESPONSABILIDAD CIVIL: EL Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



PRECAUCION