

Tamaño: 27 x 15
06.01.2026

CARACTERÍSTICAS

El sistema de administración de calcio **MovCalcio** con tecnología CaT™ permite a las plantas absorber el calcio y distribuirlo a los tejidos para que no presenten deficiencias.

Los tejidos de las plantas no absorben el calcio uniformemente, lo que puede ocasionar deficiencias localizadas que limiten el rendimiento y la calidad del cultivo. Los productos con calcio convencionales sólo suministran calcio mas no contribuyen en la distribución de este.

MovCalcio permite mejorar el rendimiento y la calidad de frutos cosechados y también en post cosecha de los cultivos por la mejor distribución de calcio.

PRECAUCIONES:

Evite las aplicaciones en condiciones climáticas extremas (sequía, baja humedad relativa, heladas y lluvia). Lave todo el equipo de aplicación antes y después de su uso. Utilice este producto de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas, que Incluyen utilizar equipo adecuado calibrado para obtener cobertura apropiada.

MEZCLA DE TANQUE:

Compatible con la mayoría de los pesticidas, adyuvantes y fertilizantes foliares. La mezcla con productos que contienen altos niveles de sulfato o fosfato puede causar precipitación. Siempre mezcle previamente el contenido en una jarra para garantizar la compatibilidad del producto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en el envase original en un lugar fresco y seco, mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

ADVERTENCIAS DE SALUD Y SEGURIDAD

H302 Nocivo en caso de ingestión. H316 Provoca una leve irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. H402 Nocivo para los organismos acuáticos. P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P273 No dispersar en el medio ambiente. P280 Usar equipo de protección para los ojos/la cara. P301 + P312 + P330 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Enjuagarse la boca. P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P332 + P313 En caso de irritación cutánea: consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.



COMPATIBILIDAD:

Se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación de campo.

FITOTOXICIDAD:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

MOVcalcio

(Bioestimulante)

Composición:

N total: 8.0 %p/p
Zn: 0.8 %p/p
CaO: 14.0 %p/p

Densidad : 1.35 – 1.55 g/ml
pH : 2.0 – 3.5



CONTENIDO NETO DEL ENVASE :

☐ 1 L ☐ 5 L ☐ 10 L ☐ 20 L ☐ 200 L ☐ 1000 L

Nº de lote:
Fecha de fabricación:
Fecha de vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO

Toda preparación debe hacerse disolviendo el producto en la cantidad recomendada de agua, bajo agitación constante. Llene el tanque de preparación con agua hasta la mitad, agregue el producto y agite constantemente, luego vierta la cantidad de agua restante y continúe agitando.

Agitar el envase vigorosamente previo a la adición al tanque.

CULTIVO	DOSIS x L/Ha	DOSIS L X CIL.	INDICACIONES
Arándano	1.5-2.0	0.5-0.7	Realizar 3 aplicaciones cada 15 días desde el cuajado de los frutos. Repetir las aplicaciones en cada ciclo de floración.
Uva de mesa	1.5-2.0		Realizar la primera aplicación al 50% de floración, luego a los 7, 21 y 35 días después del cuajado
Fresa, frambuesa	1.0-2.0	0.3-0.6	Realizar 3 aplicaciones cada 14 días desde el inicio de la floración.
Mango	2.0-3.0	0.75-1.0	Realizar 3 aplicaciones desde el cuajado del fruto, cada 21 días.
Palto	2.0-3.0		Realizar 3 aplicaciones desde el cuajado del fruto, cada 21 días.
Mandarina, naranja, tangelo	2.0-3.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio del cuajado.
Granado	1.0-2.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio del cuajado.
Higo	1.0-2.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio de la formación del fruto
Pimiento, piquillo, paprika, ají	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14-21 días desde el inicio del cuajado de los frutos
Pitahaya	1.0-2.0		Aplicar al inicio de la formación del fruto, repetir las aplicaciones a los 14 y 21 días posteriores.
Sandia, melón, pepinillo	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14-21 días desde el inicio de la floración
Tomate	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14 -21 días desde el inicio de la floración.
Alcachofa	1.0-2.0	0.6	Realizar 3 aplicaciones desde la aparición de las primeras frutos cada 14 a 21 días.
Lechuga	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones desde el cierre de la cabeza.



Fabricado para:
Chemie Agroveterinaria® S.A.C. por CRODA Europe Limited. (Reino Unido)
Importado y Distribuido por Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
Av. Tomas Ramsey 930 Of. 905 Magdalena del Mar, Lima, Perú.
FONO: (51-1) 505-4301

www.chemiesa.com

PRODUCTO FABRICADO EN REINO UNIDO