

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 10
Fecha Revisión: 10-07-2024

PRODUCTO:
MovCalcio



I. Nombre Comercial	: MovCalcio
II. Ingrediente Activo	: Nitrógeno, Calcio y Zinc
III. Tipo	: Bioestimulante.
IV. Concentración	: N total: 8.0 %p/p Zn: 0.8 %p/p CaO:.....14.0 %p/p
V. Densidad	: 1.35 – 1.55 g/ml
VI. pH	: 2.0 – 3.5
VII. Formulación	: Líquida
VIII. Modo de Acción	: Estimulación de la movilización del calcio
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: El sistema de administración de calcio MovCalcio con tecnología CaT™ permite a las plantas absorber el calcio y distribuirlo a los tejidos para que no presenten deficiencias. Los tejidos de las plantas no absorben el calcio uniformemente, lo que puede ocasionar deficiencias localizadas que limiten el rendimiento y la calidad del cultivo. Los productos con calcio convencionales sólo suministran calcio mas no contribuyen en la distribución de este. MovCalcio permite mejorar el rendimiento y la calidad de frutos cosechados y también en post cosecha de los cultivos por la mejor distribución de calcio.
XII. Compatibilidad	: Se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación de campo.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 10
Fecha Revisión: 10-07-2024

PRODUCTO:
MovCalcio



XIV. Precauciones

: Evite las aplicaciones en condiciones climáticas extremas (sequía, baja humedad relativa, heladas y lluvia). Lave todo el equipo de aplicación antes y después de su uso. Utilice este producto de acuerdo con las buenas prácticas agronómicas, que Incluyen utilizar equipo adecuado calibrado para obtener cobertura apropiada.

XV. Instrucciones de uso:

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Toda preparación debe hacerse disolviendo el producto en la cantidad recomendada de agua, bajo agitación constante. Llene el tanque de preparación con agua hasta la mitad, agregue el producto y agite constantemente, luego vierta la cantidad de agua restante y continúe agitando.

MEZCLA DE TANQUE: Compatible con la mayoría de los pesticidas, adyuvantes y fertilizantes foliares. La mezcla con productos que contienen altos niveles de sulfato o fosfato puede causar precipitación. Siempre mezcle previamente el contenido en una jarra para garantizar la compatibilidad del producto.

CULTIVO	DOSIS x L/Ha	Dosis L x Cil.	Indicaciones
Arándano	1.5-2.0	0.5-0.7	Realizar 3 aplicaciones cada 15 días desde el cuajado de los frutos. Repetir las aplicaciones en cada ciclo de floración.
Uva de mesa	1.5-2.0		Realizar la primera aplicación al 50% de floración, luego a los 7, 21 y 35 días después del cuajado
Fresa, frambuesa	1.0-2.0	0.3-0.6	Realizar 3 aplicaciones cada 14 días desde el inicio de la floración.
Mango	2.0-3.0	0.75-1.0	Realizar 3 aplicaciones desde el cuajado del fruto, cada 21 días.
Palto	2.0-3.0		Realizar 3 aplicaciones desde el cuajado del fruto, cada 21 días.
Mandarina, naranja, tangelo	2.0-3.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio del cuajado.
Granado	1.0-2.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio del cuajado.
Higo	1.0-2.0		Realizar 3 aplicaciones cada 21 días desde el inicio de la formación del fruto

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 10
Fecha Revisión: 10-07-2024

PRODUCTO:
MovCalcio



Pimiento, piquillo, paprika, ají	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14-21 días desde el inicio del cuajado de los frutos
Pitahaya	1.0-2.0		Aplicar al inicio de la formación del fruto, repetir las aplicaciones a los 14 y 21 días posteriores.
Sandia, melón, pepinillo	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14-21 días desde el inicio de la floración
Tomate	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones cada 14 -21 días desde el inicio de la floración.
Alcachofa	1.0-2.0	0.6	Realizar 3 aplicaciones desde la aparición de los primeros frutos cada 14 a 21 días.
Lechuga	1.0-2.0	0.5	Realizar 3 aplicaciones desde el cierre de la cabeza.

Ficha técnica válida para Perú.