

FICHA TÉCNICA

ORGABIOL



Bioestimulante para reactivar la
formación de hormonas

CONCENTRADO SOLUBLE(SL)

01 GENERALIDADES

ORGABIOL, es un Bioestimulante aprobado para su uso en agricultura orgánica, diseñado para recuperar la formación de hormonas internas en las plantas, necesarias para optimizar y restablecer los procesos de crecimiento, floración, cuajado de frutos, desarrollo de frutos u otros órganos cosechables, lo que se traduce en el incremento de la producción de los cultivos.

02 COMPOSICIÓN

Carbohidratos Totales	6.58%p/v
Ácidos polihidroxilados	2.18%p/v
Peptinatos	1.67%p/v
Materia Orgánica	7.06%p/v
Calcio (CaO)	0.16%p/v
Magnesio (MgO)	0.61%p/v
Cobre (Cu)	0.02%p/v
Zinc (Zn)	0.03%p/v
Nitrógeno Total	0.37%p/v
Fósforo Total (P ₂ O ₅)	0.05%p/v
Potasio (K ₂ O)	1.20%p/v

03 MECANISMO DE ACCIÓN

ORGABIOL reactiva la formación de Hormonas Internas en las plantas, regulando en forma natural el equilibrio hormonal y enzimático, lo que permite la máxima expresión del Potencial Genético-Productivo y por tanto la optimización de los procesos de crecimiento, floración, cuajado de frutos u otros órganos cosechables y su desarrollo hasta la maduración, lo que se traduce en el incremento de los niveles de Productividad (cantidad y calidad de cosecha)

04 CARACTERÍSTICAS

ORGABIOL es un Bioestimulante obtenido por procesos de fermentación enzimática controlada, cuya función es recuperar los niveles hormonales en los cultivos.

ORGABIOL es un complemento ideal para los programas de fertilización ya que mejora el transporte y la máxima asimilación de los minerales, asegurando de esta manera una adecuada Biodisponibilidad de nutrientes.

01 GENERALIDADES

02 COMPOSICIÓN

03 MECANISMO DE ACCIÓN

04 CARACTERÍSTICAS

05 RECOMENDACIONES DE USO

06 INFORMACIÓN ADICIONAL

07 PERIODO DE REINGRESO A CAMPO

08 PRESENTACIONES



ORGABIOL se aplica en aspersiones foliares, en las etapas de crecimiento inicial, inicio de floración y crecimiento de frutos y tubérculos.

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO APLICACIÓN
Papa	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a.: 30-45 días después de la siembra. 2a. 15-20 días después de la aplicación anterior. 3a. 15-20 días después de la aplicación anterior 4a. Aplicación para el llenado de tubérculos
Hortalizas; alcachofa, cebolla, ajo, brócoli, pimiento, páprika, ajíes; escabeche, rocoto.	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. 7-15 días después del trasplante, o a los 10-15 cm de altura. 2a. Entre los 7-15 días de la 1a. 3a. antes de la floración 4a. durante el llenado de frutos, en el Tomate repetir la aplicación por cada piso floral.
Leguminosas; pallar, fréjol, vainita, haba, soya, arveja, maní, holantao.	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. a la 3a. o 4ta. hoja verdadera. 2a. aplicación en prefloración (después de 7-15 días) 3a. durante el cuajado de vainas.
Cucurbitáceas; sandía, zapallo, melón, pepino.	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. aplicación a la 3a. hoja verdadera. 2a. aplicación durante crecimiento rápido, antes de la aparición de flores femeninas, 3a. en el cuajado de frutos 4a. en el crecimiento del fruto.
Arroz	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. a los 15 días después del trasplante. 2a. entre los 60-70 días (punto algodón). 3a. al inicio del panojado.
Naranja, mandarina, limón, palto, manzano, pera, mango, higo, granado, arándanos.	500 ml/Cil 200 L 2 L/Ha.	1a. antes de la floración. 2a. durante el cuajado de frutos 3a. y 4ta. con intervalos de 20 días.
Algodón	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. después del desahije. 2a. antes de floración. 3a. aplicación al inicio del cuajado de frutos.
Vid	500 ml/Cil 200 L 2 L/Ha.	1a. a los 7 días del brotamiento. 2a. cuando aparezcan los primeros brotes florales 3a. durante el cuajado de frutos 4a. cuando el fruto esté totalmente definido.
Espárrago	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. después de la brotación en plantas con 30 cm. de altura. 2a. aplicación 5 días después 3a. aplicación 30 días después.
Fresa	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. 10 días después del trasplante, 2a. 14 días después, 3a. durante la floración y las siguientes con intervalos de 14 días durante el período productivo.
Maíz	500 ml/Cil 200 L 1 L/Ha.	1a. 7-10 días después de la emergencia 2a. 15 días después de la aplicación anterior 3a. Inicio de formación de panojas
Tratamiento de plantas estresadas por fenómenos adversos		
Todos los Cultivos	500 ml/Cil 200 L	Estrés de las plantas por efecto de: heladas, calor, sequía, asfixia radicular, fitotoxicidad, plagas, etc. Según sea el daño aplicar 1-3 veces separando las aplicaciones 15 días haciendo una mezcla en cada aplicación con Master Down (0.5 L/200 L) más Energen (0,5 L/200 L.)

06 INFORMACIÓN ADICIONAL

COMPATIBILIDAD

ORGABIOL es compatible con la mayoría de pesticidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas y acaricidas) y fertilizantes comúnmente usados, con excepción de los de reacción alcalina. Es importante antes de efectuar la mezcla, hacer una prueba de compatibilidad.

ALMACENAMIENTO

ORGABIOL debe ser conservado bajo un ambiente fresco y seco. Evitar temperaturas extremas. Procurar que el producto no permanezca en el sol por un periodo prolongado.

FICHA TÉCNICA

ORGABIOL



FICHA TÉCNICA

ORGABIOL

PERIODO DE REINGRESO AL CAMPO:

ORGABIOL por su naturaleza, no presenta restricciones luego de realizar la aplicación en las áreas de tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Es recomendable, al utilizar el producto **ORGABIOL**, manipularlo con un equipo de protección personal completo (overol, guantes, anteojos, etc.)
- Mantener alejado de los niños, animales domésticos y alimentos.
- En caso de ingesta no inducir al vómito. Enjuagar la boca con abundante agua y busca atención médica.
- Nunca dar a beber ni inducir al vómito a personas en estado inconsciente.
- El contacto directo con los ojos puede producir irritación, para lo cual se recomienda lavar con abundante agua.
- Tratamiento médico: sintomático.
- Almacenar en un lugar frío y con buena ventilación.

07 PERIODO DE REINGRESO A CAMPO

ORGABIOL, por su naturaleza, no presenta restricciones luego de realizar la aplicación en las áreas de tratamiento.

08 PRESENTACIONES

ORGABIOL es comercializado en presentaciones de: 1L, 5L, 20L y 200L.

Atención al cliente:
info@biogenagro.com

LEA BIEN LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO



Fabricado por:
BIOGEN AGRO S.A.C.
Calle René Descartes 311. Urb. Santa Raquel
2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: (511) 612-6565
www.biogenagro.com
RUC.: 20417432397



Distribuido por:
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes Nº 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: (01) 612-6565
www.talex.com.pe
RUC.: 20513013826

© Marca Registrada