



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación de **SUNCROPS**:

Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón y/o traje de Tyvek, mascarilla con filtro para neblinas o vapores, lentes de seguridad transparentes con protección hermética, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo para evitar el contacto directo.

Después de aplicar **SUNCROPS** lave el equipo de aplicación para evitar deterioro, báñese, cámbiese de ropa y lave ésta antes de volver a usarla.

Cabe señalar que la ropa de trabajo deberá ser lavada y guardada en el lugar de trabajo y no almacenarse o mezclarse con ropa de uso diario.

1. No coma, beba o fume cuando esté utilizando este producto.
2. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
3. Manténgase fuera del alcance de los niños.
4. Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
5. No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.
6. En caso de presentar molestias por el contacto con el producto lleve a la persona con el médico.

SUNCROPS

PREVENCIÓN DEL DAÑO SOLAR

SUNCROPS es un protector de cultivos de última generación que forma una película mineral de caolinita refinada, procesada y certificada, que refleja la radiación UV, IR y visible. **SUNCROPS** está orientada a la prevención del daño por sol y estrés térmico e hídrico. Se aplica en forma foliar como una película traslúcida, que se seca y lava con facilidad.

Dentro de sus atributos: Mejora la eficiencia del uso del agua; mejoras en grados Brix 1 TSS; reducción de aborto floral; reducción stress hídrico; frutos de mejor calidad; reducción en la caída de frutos; reducción de la alternancia de producción; aumento de rendimiento y calidad, asociado a una mejora en la fitosanidad del cultivo.

Contenido Neto: ☐ 1 kg. ☐ 12,5 kg.

APLICACIONES

DOSIS:

1. Programa preferencial de tratamiento con una baja concentración: Aplicaciones subsiguientes en intervalos de 15-21 días a una concentración de 2,5kg/200l (1000 lts agua).

2. Control de quemadura del sol/daño por el calor en la estación avanzada:

Aplicación inicial: 5kg/200L. Aplicaciones subsiguientes en intervalos de 14 a 21 días a una concentración de 2,5kg/200L.

COMENTARIOS:

• Cítricos, paltos, olivos, granada: primera aplicación 1,5%, segunda y tercera aplicación al 1.25% y las siguientes al 0,7% con intervalos de 14 a 21 días.

• Arándanos: las aplicaciones se iniciarán a la semana de la poda, la segunda aplicación 2 semanas después de la primera, y las siguientes cada 3 semanas.

"V10"

16 cms Alto

Fabricado por:
NUTRIPROVE S.A.
www.nutriprove.com

NUTRIPROVETM
Nutrition and plant protection

CHEMIE[®]
Innovación Agroveterinaria

Importa y distribuye:
Chemie Agroveterinaria[®] S.A.C.
Av. Tomas Ramsey 930 Int.
905 Magdalena del Mar. Lima