

SUPERSOIL es una enmienda orgánica líquida altamente concentrada y un acondicionador de suelo natural, de origen vegetal. El formulado contiene elementos esenciales para el funcionamiento metabólico de la planta, provocando una importante acción bioestimulante y mejorando su capacidad y resistencia frente a estados de estrés ambiental.

SUPERSOIL en aplicaciones foliares proporciona enzimas a la planta

que activan procesos fisiológicos como transformación de almidón en azúcares (amilasa), disminución de acidez en la fruta (quinazas) y aumento de color en frutos y flores (hidrolasa). Cuando se usa como nutriente, las etapas fisiológicas más indicadas son crecimiento de fruto y maduración.

SUPERSOIL por la rapidez de absorción y su acción complejante de la sustancia orgánica, puede ser usado como carrier de productos fitosanitarios y fertilizantes solubles.

p/v

Materia Orgánica	42 %
Ácidos Fúlvicos	40 %
Potasio (K_2O)	4,5 %

Densidad : 1,2 - 1,4 g/ml
pH : 3,0 - 5,0

A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de control, en medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su contenido directo.

Etiqueta valida para Perú

AGÍTESE ANTES DE USAR

ENMIENDA ORGÁNICA LÍQUIDA



- Activa la microflora del suelo.
- Aumenta la Capacidad de Intercambio Catiónico.
- Incrementa la actividad del sistema radicular.
- Rápida absorción.

**CONTENIDO NETO DEL ENVASE:**

1 L 5 L 20 L 200 L 1000 L



FERTIRRIEGO: 50 – 80 L/ha/campaña - 10 L/ha/aplicación
FOLIAR: 1 – 2 L/200 litros de agua

CULTIVO	RECOMENDACIONES
Palto Limon, naranja, mandarina, tangelo. Mango.	1º Al inicio de la floración. 2º Después del cuajado. 3º Al inicio del crecimiento de frutos.
Uva de mesa	1º Al inicio del brote vegetativo 2º Al inicio de la floración 3º Después del cuajado 4º Al inicio del crecimiento de frutos
Arándano. Fresa.	A partir de inicio de riego por 10 a 12 semanas 1º Al inicio del brotamiento. 2º Al crecimiento vegetativo. 3º Al inicio de la floración. Post-cosecha Riego 4 - 5 L/ha/semana a partir de 2ª semana de término de cosecha por 4 a 5 semanas.
Banano	1º A la aparición de la inflorescencia 2º A los 15 días luego de la 1ª aplicación.
Sandia, melón, pepino.	1º 15 días después de la emergencia 2º 15 días después de la 1ª aplicación 3º Al inicio de la floración.
Papa.	1º 15 días después de la emergencia 2º 15 días después de la 1ª aplicación 3º Al inicio de la floración 4º 20 a 25 días de la 3ª aplicación.
Tomate Pimiento, paprika, piquillo, ají.	1º 10 días después del trasplante 2º Al inicio de la floración y cuaje 3º Al inicio de fructificación 4º En etapa de maduración de frutos
Brócoli, coliflor, col Alcachofa Lechuga, apio.	1º En almáximo 2º 15 días después del trasplante 3º 15 días después de la 2ª aplicación
Cebolla.	1º En almáximo 2º 10 días después del trasplante 3º Al llenado de bulbo 4º 15-20 días después de la 3ª aplicación
Espárrago	1º Al inicio del 1º brote 2º 15-20 días después de la 1ª aplicación 3º Al inicio del segundo brote 4º 15-20 días después de la 3ª aplicación
Pitahaya.	1º 20 días después del trasplante. 2º 15 días después de la 1ª aplicación. 3º 15 días después de la 2ª aplicación.
Granada.	1º Al inicio del brotamiento. 2º Al crecimiento vegetativo. 3º 15 días después de la 2ª aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se debe evitar su mezcla con productos cúpricos, aceites minerales y compuestos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.

PRECAUCIONES:

Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos y medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.



FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.
AV. TOMAS RAMSEY 930 OF. 905, MAGDALENA DEL MAR - LIMA, PERU
FONO (51-1) 505-4301, R.U.C 20519361672

www.chemiesa.com

PRODUCTO FABRICADO EN PERÚ

ETIQUETA SUPERSOIL X 1,5,20,200,1000 LITROS
FECHA: 25.04.2025
VERSION: 15
TAMAÑO: 27 X 15 CMS
IMPRESION: FULL COLOR
MATERIAL: COUCHE ADHESIVO SEGURIDAD
ACABADO FINAL: BARNIZ OFFSET Y SEMI CORTE PARA DESGLOSE