

CARACTERÍSTICAS

VIGORUM es un activador de la planta a base de aminoácidos, AATC, ácido fólico y enriquecido con algas marinas que estimula la germinación, el desarrollo vegetativo, la floración y el crecimiento de frutos. **VIGORUM** activa los principales procesos bioquímicos en las etapas críticas del cultivo, promoviendo el desarrollo de éste lo que se traduce en mejores cosechas. **VIGORUM** está especialmente diseñado para favorecer todos los procesos fisiológicos de las plantas tales

como fotosíntesis, respiración, síntesis de proteínas, lípidos, carbohidratos, etc. El empleo de **VIGORUM** está especialmente indicado cuando el cultivo ha estado sometido a situaciones de estrés, tales como temperaturas extremas, enfermedades, fitotoxicidad, asfixia radicular, estrés hídrico, plantas en suelos salinos, etc. y que mejora la capacidad de las plantas tratadas para superar las condiciones adversas.

COMPOSICIÓN

Ácido Fólico p/v 0.02%
AATC 0.1%
Aminoácidos 24%

Densidad : 1.1 - 1.2 g/mL
pH : 3 - 5

PRECAUCIONES: Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas. No existe restricción en cuanto al tiempo de reingreso al área tratada. Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

INSTRUCCIONES DE USO: Para usar adecuadamente **VIGORUM**, se

recomienda agitar el envase antes de abrir, luego agregar agua al estanque de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad, posteriormente incorporar la dosis recomendada de **VIGORUM** y finalmente llenar el estanque. Es necesario realizar esta maniobra con agitación constante.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con productos fitosanitarios, sin embargo, se recomienda realizar previamente pruebas de aplicación a nivel de campo.

NOTA AL COMPRADOR

A nuestro mejor entender, las informaciones que se dan en esta etiqueta son verdaderas y exactas. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, puesto que su aplicación está fuera de control, en medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume absolutamente todos los riesgos de uso y manejo, procédase o no de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su contenido directo.

Etiqueta valida para Perú.

15"

VIGORUM BIOESTIMULANTE



- Recupera la planta del estrés
- Activador del crecimiento

CONTENIDO NETO DEL ENVASE:

1 L 5 L 20 L 200 L 1000 L

CHEMIE
Innovación Agroveterinaria

APLICACIONES

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Uva de mesa	2 – 3 L/Ha.	Inicio de la floración (retrasa el inicio de la pinta).
Arándano, fresa	2 – 3 L/Ha.	Inicio de la floración (retrasa el inicio de la pinta).
Palto	2 – 3 L/Ha.	3 tratamientos cada 20 días desde principio de floración.
Limón, naranja, mandarina, tangelo	2-3 L/ha	3 tratamientos: - Inicio floración. - Floración plena. - Al cuajado de los frutos.
Granada	360-500 ml/200 L de agua	3 a 4 tratamientos cada 15 días a partir de la floración y desarrollo del fruto.
Mango	360-500 ml/200 L de agua	1. Inicio de la floración. 2. Floración plena. 3. Cuajado.
Alcachofa	500-750 ml/200 L de agua	1. A la elongación del tallo. 2. A los 15 días después de la 1ra aplicación.
Espárrago	500 ml/200 L de agua	1. A la elongación del filocladio 2. A los 15 días después de la 1ra aplicación.
Pitahaya	500 ml/200 L de agua	1. Al inicio de la floración. 2. A los 15 días después de la 1ra aplicación.
TomatePimiento, aji, paprika, piquillo	500 ml/200 L de agua	- A los 15 días después del trasplante. - Al inicio de floración y cuajado.
Lechuga, espinaca, acelga, apio, col, brocoli, coliflor	300-500 ml/200 L de agua	- Aplicar a los 10 días después del trasplante. - En pleno desarrollo vegetativo.
Melón, sandia, zapallo, pepinillo	300-500 ml/200 L de agua	- Aplicar a los 15 días después de la germinación. - Aplicar a inicios de floración.
Papa	300-500 ml/200L de agua	- Aplicar al inicio de la tuberización. - Repetir a los 10 días.



Fabricado por: CHEMIE AGROVETERINARIA® S.A.C.
Av. Tomas Ramsey 930 Of. 905, Magdalena del Mar, Lima - Perú.
FONO (51-1) 505-4301, R.U.C. 20519361672

www.chemiesa.com

PRODUCTO FABRICADO EN PERÚ

ETIQUETA VIGORUM X 1,5,20,200,1000 LITROS

FECHA: 02.05.2025

VERSION: 14

TAMAÑO: 27 X 15 CMS

IMPRESION: FULL COLOR

MATERIAL: COUCHE ADHESIVO SEGURIDAD

ACABADO FINAL: BARNIZ OFFSET Y SEMI CORTE PARA DESGLOSE