

Teosim

FUNGICIDA

INGREDIENTE ACTIVO	%
Bacillus Subtilis (Unid. Formadoras de colonias)	1 x 10^9 UFC/ml

DESCRIPCIÓN:

TEOSIM, fórmula 4E (eficaz, eficiente, ecológico y económico) para su formulación de metabolitos fungicos y bacterias SynComs. Una formulación de bacterias altamente activas en suspensión líquida concentrada, en un medio compuesto de ácidos orgánicos.
Control total de patógenos (Oidium, Botrytis, Phyptoptora.) y enfermedades saprofitas como Lasiodiplodia spp, Cladosporium sp.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Los metabolitos que contiene el producto hacen efecto inmediato de choque (nocout) destruyendo la pared celular de la plaga.

PERIODO, MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN:

-Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo, en forma preventiva y/o curativa según se observe el desarrollo del hongo patógeno.
-Hacer rotaciones con los químicos y/o mezclar no presenta inconvenientes.
-Usar dosis mínima o máxima según presencia del patógeno o incidencia de la enfermedad .
- Buena cobertura permitirá un excelente control.

RECOMENDACIÓN DE USO:

- Es compatible con todos los plaguicidas, fertilizantes foliares y bioestimulantes.
- El producto debe ser conservado en su envase original bajo condiciones de temperatura de 10 a 24°C y bajo sombra.
- No comer, beber o fumar durante operaciones de manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, y aplicación.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- No almacenar, ni transportar el producto junto con alimentos, medicinas, bebidad y forrajes.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CONSULTAR AL DEPARTAMENTO TÉCNICO.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es Fitotóxico, si se aplica en las dosis y de la manera aquí recomendadas.

Cel: 981455604-951387863
campo@agrobioticossac.com
www.agrobioticossac.com
Cal.cusihuaman Mz. C2-UrbSanta Luzmila Nro. 22 Lima - Lima - Comas

agrobioticos
sembrando vida...



TABLA DE DOSIFICACIÓN :

CULTIVO	ENFERMEDAD Y FENOLOGIA	DOSIS
Vid	• Oidium (Uncinula necator) - Punta de algodón, brote (10,15cm) flor. • Mildiu (Plasmopara vitícola) - Húmedas y Temperatura alta. • Pobredumbre Gris (Botrytis cinerea) - Cierre de racimo y pre cosecha.	4- 6 Lt/Ha 5 - 8 Lt/Ha 5 Lt/Ha
Arándano	• Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobomare) -Poda. • Mancha Parda (Alternaría sp) - Brote cada 10 días. • Botrytis (Botrytis sp) - Botón flor y frutos	0.5 - 1 Lt/Cil 0.5 - 1 Lt/Cil 5 Lt/Ha
Palto	• Lasiodiplodia (Lasiodiplodia theobomare) - Poda • Cladosporium (Cladosporium sp) - Panícula cerrada • Pobredumbre Gris (Botrytis sp) - Panícula abierta, flor y cuajado y botón.	5 Lt/Ha 5 Lt/Ha 5 Lt/Ha
Cítrico	• Mancha Parda (Alternaría sp) - Brote 0.5 cm • Mancha Grasienta (Mycosphaerella citri) - Brote de poda, brote de primavera y verano. • Pobredumbre Gris (Botrytis sp) - Botón 30%, 60% y floración.	0.5 - 1 Lt/Cil 0.5 - 1 Lt/Cil 5 Lt/Ha
Espárrago	• Roya (Puccina asparagi) - Brotacion de 15 días levante. • Mancha Púrpura (Stemphylium besucarían) - Brote de 30 días de levante. • Mancha chocolate (Cercospora asparagi) - Brote de 20-30 días de levante.	0.5 - 1 Lt/Cil 0.5 - 1 Lt/Cil 0.5 - 1 Lt/Cil

Cel: 981455604-951387863
campo@agrobioticossac.com
www.agrobioticossac.com
Cal.cusihuaman Mz. C2-UrbSanta Luzmila Nro. 22 Lima - Lima - Comas

agrobioticos
sembrando vida...